



Con Detección De Celos

Select Synch




Select Synch + CIDR®



Detección de Celos & IATF


Select Synch & IATF

Detectar celo e IA día 6 a 10, e IATF a todas las no-detectadas 72-84 horas después de la PG con GnRH al momento de la IA.



Select Synch + CIDR® & IATF

Detectar celo e IA día 7 a 10, e IATF a todas las no-detectadas 72-84 horas después de la PG con GnRH al momento de la IA.



Comparación de Protocolos Para Vacas de Carne

Con Detección de Celos	Costo	Labor
Select Synch	Bajo	Medio/Alto
Select Synch + CIDR®	Alto	Medio

Detección de Celos & IATF	Costo	Labor
Select Synch <i>(IATF no-detectadas 72-84 horas después de PG)</i>	Bajo	Medio/Alto
Select Synch + CIDR® <i>(IATF no-detectadas 72-84 horas después de PG)</i>	Alto	Medio

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF)

	Costo	Labor
CO-Synch + CIDR® <i>(IATF 60-66 horas después de PG con GnRH a la IA)</i>	Alto	Medio

* Los tiempos puestos para IATF son tiempos promedios de IA. Estos debe ser basado en el número de vacas a IA, mano de obra e instalaciones.


GnRH Cystorelin®, Factrel®, Fertagyl®, OvaCyst®

PG estroPLAN™, Estrumate®, In-Synch®, Lutalyse®, ProstaMate®

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF)*

CO-Synch + CIDR®

IATF entre 60-66 horas después de PG con GnRH al momento de la IA.



Teléfono: (614) 873-4683


Fax: (614) 873-5751

www.selectsires.com




Con Detección de Celos


1 Inyección PG



CIDR® - PG




MGA® - PG



Detección de Celos e IATF


Select Synch + CIDR® & IATF

Detectar celo e IA días 7 - 10 e IATF a las no-detectadas 72 - 84 horas despues de PG con GnRH al momento de IA.



MGA® - PG & TAI

Detectar celo e IA días 33 - 36 con IATF a las no-detectadas 72 - 84 horas despues de PG con GnRH al momento de IA.



Comparación de Protocolos para Vaquillas de Carne

Detección de Celos

	Costo	Labor
1 Inyección de PG	Bajo	Alto
CIDR® - PG	Medio	Medio
MGA® - PG	Bajo	Bajo/Medio

Detección de Celos & IATF

	Costo	Labor
Select Synch + CIDR® (IATF no-detectadas 72-84 horas despues de PG)	Alto	Medio
MGA® - PG (IATF no-detectadas 72-84 horas despues de PG)	Medio	Medio

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF)

	Costo	Labor
CO-Synch + CIDR® (IATF 54 ± 2 horas despues de PG con GnRH al momento de IATF)	Alto	Medio
MGA® - PG (IATF 72 ± 2 horas despues de PG con GnRH al momento de IATF)	Medio	Medio
CIDR® Select (IATF 72 ± 2 horas despues de PG con GnRH al momento de IATF)	Alto	Medio/Alto

* Los tiempos puestos para IATF son tiempos promedios de IA. Estos debe ser basado en el numero de vacas a IA, mano de obra e iustalaciones.


GnRH Cystorelin®, Factrel®, Fertagyl®, OvaCyst®

PG estroPLAN™, Estrumate®, In-Synch®, Lutalyse®, ProstaMate®

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF)*

Co-Synch + CIDR®

IATF 54 ± 2 horas despues de PG con GnRH al momento de la IA.



MGA® - PG

IATF 72 ± 2 horas despues de PG con GnRH al momento de la IA.



CIDR® Select

IATF 72 ± 2 horas despues de PG con GnRH al momento de la IA.

